légèrement transparente à la lumière. Moins de deux heures après l'opération décrite ci-dessus, la chenille avait complètement changée de couleur.

RHOPALOCÈRES DU NORD-OUEST DE LA GRÈCE (RÉGION DE FLORINA)

DAGVLINDERS UIT HET NOORD-WESTEN VAN GRIEKENLAND (DE STREEK ROND FLORINA)

par door
Michel DECARPENTRIE
(6 avenue du 3e Chasseur, B-7500 Tournai)

Suite à plusieurs voyages en Grèce, je tiens à signaler la capture de deux espèces d'*Erebia* qui, jusqu'à présent, à ma connaissance, n'avaient jamais été signalées dans cette région.

Erebia euryale Esper: capturé vers 1500 m, le 19.VII.1985, en compagnie de l'espèce voisine *E. ligea* L. La différenciation entre les deux espèces ne pose aucune difficulté: les ♂ de *ligea* sont très grands et très marqués. Les ♂ de *euryale* sont tous plus petits d'un tiers par rapport à ceux de *ligea*. De plus, ils sont très peu marqués au verso.

Erebia epiphron Knoch: capturé vers 1700 m, le 19.VII.1985.

Na meerdere reizen naar Griekenland wil ik de vangst melden van twee soorten *Erebia*, die bij mijn weten tot nog toe nooit werden gemeld uit deze streek.

Erebia euryale Esper: aangetroffen rond 1500 m op 19.VII.1985 in gezelschap van de verwante soort, *E. ligea* L. Het onderscheid tussen deze twee species levert geen moeilijkheden op: de ♂ van *ligea* zijn zeer groot en sterk getekend. De ♂ van *euryale* zijn minstens 25% kleiner en zijn daarenboven aan de onderkant zeer weinig getekend.

Erebia epiphron Knoch: gevangen rond 1700 m op 19.VII.1985.

VARIA BIBLIOGRAPHICA (suite:vervolg)

1985. Alexanor, XIV, -

GOATER Barry - Apotomis inundata (Denis & Schiffermüller) pris dans le bois de Merles (Meuse) en 1984. (1: 2, 1 fig.).

NEL Jacques - Note sur l'écologie et la biologie de Pyrgus foulquieri Obth. en Provence et dans le Briançonnais. Comparaizon avec Pyrgus alveus Hb. (Lep. Hesperiidae). (1: 3-8, 6 fig.).

DENIZE Guy - Nouvelle capture d'Everes alcetas en Savoie (Lep. Lycaenidae). (1: 8).

GIBEAUX Chr. - Etude des Stenoptilia français (2e note). Stenoptilia saxifragae Fletcher existe-t-il en France? (1: 9-12, 5 fig.).

REAL P. - Euxoa castra blandula Guenée, espèce potentiellement nouvelle pour la France (Lépidopt. Noctuidae). (1: 12-14, 1 fig.).

REAL P. - Confirmation de la présence de Zeiraphera ratzeburgiana Saxesen, 1840, dans la région lyonnaise, et remarques générales (Lep. Tortricidae, Olethreutinae). (1: 20-21).

GIBEAUX Chr. - Scythris elegantella (Lucas, 1955), comb. nov., = Scythris limbelloides Jäckh, 1977, syn. nov. (1: 22-23, 6 fig.).

TOULGOËT H. de - Coscinia bifasciata Rambur, espèce bien caractérisée (Lep. Arctiidae Arctiinae). (1: 25-28, 3 fig.).

SCHMIDT-KOEHL Werner - Résultats lépidoptérologiques de quatre voyages printaniers et estivaux dans le Midi de la France entre 1982 et 1984 (Lepidoptera, Rhopalocera et Zygaenidae). (1: 29-43, 1 map).

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΥΞ. ΑΡΙΘ. ΒΙΒΛ. 0940 1987 ΗΜΕΡ. 3/1990