

Smn 137-27

~~Finzi B., Adensamer W., Käufel F., Strouhal H. und  
Priesner H.~~

Weitere Beiträge zur Kenntnis der  
Fauna Griechenlands und der Inseln des  
Aegäischen Meeres.

Bruno Finzi, Wolfgang -

Franz Käufel, Hans Strouhal  
Priesner

Ausgabe der Akademie der Wissenschaften in Wien  
Abteilung für 137. Band

Gedruckt und unterzeichnet von dem Verleger und

1928

Hölter, Pfeiffer - Kommissionär der  
Kommissionär verleger

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ

ΠΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - 5. Λ. ΚΑΤΙΝΗΑ  
ΑΥΓ Α. Ο. ΒΙΒΑ. 1928. 015 ΑΗΜΕΡ. 6-85

## Literatur.

- Emery, Wissenschaftliche Ergebnisse der Bearbeitung von O. Leonhard's Sammlungen. 5. Südeuropäische Ameisen. — Entomologische Mitteilungen, 1914, p. 156—159.
- Forel, Nouvelles fourmis de Grèce etc. — Ann. de la Soc. Ent. de Belgique, T. XXX, 1888, CLIX e seg.
- Ameisen aus den Sporaden, den Cycladen und Griechenland. — Berliner Ent. Zeitschr., Bd. XXXII, 1888, p. 255—265.
- Südpalaearktische Ameisen. — Mitt. der Schweiz. Ent. Gesell., Vol. IX, 1895, p. 227—234.
- Glossomyrmex myrmecophagus*. — Ann. de la Soc. Ent. de Belgique, 1910, p. 6 e seg.
- Fourmis nouvelles ou intéressantes. — Bull. de la Soc. vaud. des Sciences Naturelles 1911, p. 331 e seg.
- Fourmis de la faune méditerranéenne etc. — Revue Suisse de Zoologie, Vol. 21, 1913, p. 427 e seg.
- Menzetti, Note sulla mirmecofauna paleartica. — Boll. del Lab. di zool. generale ed agraria, Portici, Vol. XXI, 1928, p. 126—129.

## II. Land- und Süßwassermollusken

aus Griechenland und von den Inseln des Ägäischen Meeres.

Bestimmt von Dr. Wolfgang Adensamer und Dr. Franz Käufel.

### 1. Streptoneura.

#### a) Ericiidae.

1. *Ericia elegans* Müll.

Korinth, 23. IV.; Skyrus (S. Insel), 3. V.; 7. bis 9. V. Skopelos; Kyra Panagia, 11. V.; Giara, 11. V.

#### b) Melaniidae.

2. *Melanopsis buccinoides* Oliv.

Skyros, 30. IV.; Lemnos 25. V.

### 2. Euthyneura.

3. *Zebrina detrita* Müll.

Berg Kasabaliotiko bei Larissa (Ossagebiet), 14. V. (überaus häufig an einer Felswand).

4. *Zebrina zebra* var. *spoliatus* Pfr.

Athen, Hymettos, 7. IV.; Phaleron, Wouliagmeni, 22. IV.

5. *Rumina decollata* L.

Athen, Turkowuni, 7. IV.; Phaleron, Wouliagmeni, 22. IV.; Milos, 15. IV.

6. *Mastus pupa* Brug.

Skopelos, 7. bis 8. V.; Kleine Insel in der Bucht von Hagios Petros, Kyra Panagia, 10. V.; Lemnos, 22. bis 25. V.

7. *Chondrula microtragus* Parr. ap. Rm.  
Berg Kasabaliotiko bei Larissa, 14. V.
8. *Chondrula turgidus* Parr.  
Skyros (Linaria), 5. V.
9. *Chondrula bergeri* Roth.  
Athen, Hymettos, 7. IV., 26. IV.; Korinth, 23. IV.
10. *Zonites chloroticus* Pfr.  
Mytilene, 20. V.
11. *Albinaria coerulea* Fer.  
Naxos, Weg von Philoti zum Ozia, 9. IV.
12. *Albinaria cristatella* Kstr.  
Skyros, 1. V.; 3. V.
13. *Albinaria cristatella cristulifera* O. Btg.  
Kyra Panagia, Felsen hoch über dem Hafen des Klosters,  
und an den Steinen der Hafentreppe, 11. V.; sonst nirgend-  
auf der Insel gesehen.
14. *Albinaria maculosa* Desh.  
Korinth, 23. IV.: Parnes, 800 bis 1200 m; Athen, Hymettos,  
26. IV.
15. *Idyla bicristata custrapha* O. Btg.  
Skopelos, an Felsen, 8. V.; unter Steinen, 9. V.; Skyros, 1. V.;  
Skyros, S. Insel, 3. V.
16. *Papillifera sabellina* L. Pfr.  
Korinth, 23. IV.
17. *Papillifera sazicola* L. Pfr.  
Athen, Hymettos 7. und 26. IV.; Athen, Turkowuni, 16. V.
18. *Papillifera chelodromia* O. Btg.  
Skopelos, an Felswänden, 7. V.; 9. 5.
19. *Papillifera chelodromia giurica* O. Btg.  
Giura, N. Sporaden, 11. V.
20. *Carinigera stussineri* O. Btg.  
Berg Kasabaliotiko bei Larissa, 14. V.
21. *Helicodonta lens* Fer.  
Parnes, 800 bis 1200 m, 24. IV.
22. *Helicodonta lens piligera* Bl. und W.  
Korinth, 23. IV.; Berg Kasabaliotiko bei Larissa, 14. V.
23. *Helicodonta lens lentiformis* Z.  
Athen, Hymettos, 26. IV.; Skyros, 30. IV., 5. V.; Skyros, S. Insel,  
8. V.; Skopelos, 3. V.; Lemnos, 22. bis 25. V.

24. *Heliomantes cretica* Pfr.  
Naxos, Weg von Philoti zum Ozia, 9. IV.; Milos, 15. IV.;  
Skyros, 1. V.; Lemnos, 22. bis 25. V.
25. *Heliomantes variabilis* Drap.  
Giura, 11. V.
26. *Trochula pyramidata* Drap.  
Athen, Turkowuni, 7. IV.
27. *Cochlicella acuta* Müll.  
Milos, 15. IV.
28. *Thiesseia cyclolabris* Desh.  
Athen, Hymettos, 20. und 26. IV., im Gebüsch zwischen Steinen  
häufig; Skyros, S. Insel, 3. V., unter Steinen an feuchten buschigen  
Stellen.
29. *Cressa pellita* Fér.  
Lemnos, 23. bis 26. V., an den Felsen des Burghügels nicht  
selten.
30. *Carthusiana olivieri* Fér.  
Korinth, 23. IV.; Athen, Hymettos, 26. IV.; Skopelos, 7. bis  
8. V.; kleine Insel in der Bucht von H. Petros, Kyra Panagia,  
10. V.; Kyra Panagia, 11. V. (nördlich vom Kloster).
31. *Carthusiana rothi* Pfr.  
Naxos, Weg von Philoti zum Ozia, 9. IV.; Mykonos, 12. IV.;  
Lemnos, 23. bis 25. V.
32. *Helix aperta* Born.  
Phaleron, Wouliagmeni, 22. IV.; Skyros, S. Insel, 3. V.; Skyros,  
Linaria, 6. V.; Jos 10. IV.
33. *Helix aspersa* Müll.  
Naxos, 8. IV.; Skyros, 1. V.; Mytilene, 20. V.
34. *Pseudofigulina pelasgica* Kob.  
Athen, Hymettos, 20. IV.; Mykonos, 12. IV.; Thessalische Ebene  
bei Larissa, 14. V.
35. *Eobania vermiculata* Müll.  
Athen, Turkowuni, 7. IV.; Naxos, Weg Philoti—Ozia, 9. IV.;  
Jos, 10. IV.; Milos, 15. IV.; Skyros, 30. IV., 1. V.; Giura,  
N. Sporaden, 11. V.; Lemnos, 22. V.
36. *Euparypha pisana* Müll.  
Naxos, 10. IV.; Milos, 15. IV.

#### Die Verteilung der gesammelten Landschneeken auf die Inseln des Aegäischen Meeres.

##### Naxos:

*Albinaria coerulea*,  
*Heliomantes cretica*,  
*Carthusiana rothi*,

*Helix aspersa*,  
*Eobania vermiculata*,  
*Euparypha pisana*.

Jos:

*Helix aperta,*  
*Ebania vermiculata.*

Mykonos:

*Carthusiana rothi,*  
*Pseudosigillina pelasgica.*

Milos:

*Rumina decollata,*  
*Heliomanes cretica,*  
*Cochlicella acuta,*  
*Ebania vermiculata,*  
*Eupeorus pissauna.*

Skyros:

*Ericia elegans,*  
*Chondrula turgidus,*  
*Albinaria cristatella,*  
*Idyla bicristata eustropha,*  
*Helicodonta lens leutiformis,*  
*Heliomanes cretica,*  
*Thiessa cycloabris,*  
*Helix aperta,*  
    *aspera,*  
*Ebania vermiculata.*

Skopelos:

*Ericia elegans,*  
*Mastus pupa,*

*Idyla bicristata eustropha,*  
*Papillifera chelodromia,*  
*Helicodonta lens leutiformis,*  
*Carthusiana olivieri.*

Kyra Panagia:

*Ericia elegans,*  
*Mastus pupa,*  
*Albinaria cristatella cristulifera,*  
*Carthusiana olivieri.*

Giura:

*Ericia elegans,*  
*Papillifera chelodromia giurica,*  
*Heliomanes variabilis,*  
*Ebania vermiculata*

Lemnos:

*Mastus pupa,*  
*Helicodonta lens leutiformis,*  
*Heliomanes cretica,*  
*Cressa pellita,*  
*Carthusiana rothi,*  
*Ebania vermiculata.*

Mytilene:

*Zmiles chloroticus,*  
*Helix aspersa.*

III. Land-Isopoden<sup>1</sup>

aus Griechenland und den Inseln des Ägäischen Meeres.

Von Dr. Hans Strubel.

Fam. Potcellionidae.

*Porcellio (Porcellionoides) pyrinus Brandt*

ab. *gewinni* Verh.

Korinth, 23. IV. 1927; I. Mykonos, 12. IV. 1927; I. Jos, 10. IV. 1927; I. Skopelos, 8. V. 1927; I. Skyros, 4. V. 1927.

ab. *melcagris* B.-J..

Parnes (bei Athen), 24. IV. 1927; Korinth, 23. IV. 1927; I. Lemnos, 22./23. V. 1927; I. Lemnos, 27. V. 1927, ein Hermaphrodit.

<sup>1</sup> In dieses Verzeichnis sind auch diejenigen Isopoden aufgenommen, die von mir im Jahre 1894 auf Kephallonia und Sta. Maura gesammelt wurden.